

**Europæisk basisserie - anbefalede minimale testsæt.  
(Allergener i petrolatum/vand)**

<b>Allergener</b>	<b>Konc./vehikel</b>	<b>Alternativ</b>
Potassium dichromate	0,5% pet.	
Neomycin sulfate	20% pet.	
Thiuram mix	1% pet.	
p-phenylenediamine	1% pet.	
Cobalt chloride	1% pet.	
Benzocaine	5% pet.	
Formaldehyde	2% aq.	
Colophonium	20% pet.	
Clioquinol	5% pet.	Quinoline mix 6% in pet.
Myroxylon pereirae ( <i>Balsam of Peru</i> )	25% pet.	
N-Isopropyl-N'-phenylparaphenylenediamine ( <i>IPPD</i> )	0,1% pet.	
Wool alcohols ( <i>lanolin alcohol</i> )	30% pet.	
Mercapto mix	1% pet.	
Epoxy resin	1% pet.	
Paraben mix	16% pet.	
para-tertiary-butylphenol-formaldehyde resin ( <i>PTBP resin</i> )	1% pet.	
Fragrance mix I	8% pet.	
Quaternium-15	1% pet.	
Nickel sulphate	5% pet.	
Methylisothiazolinone/methylchlorisothiazolinone	0.02% aq.	
Mercaptobenzothiazole	2% pet.	
Primin	0,01% pet.	
Sesquiterpene lactone mix	0,1% pet.	
Budesonide	0,01% pet.	
Tixocortol pivalate	0,1% pet.	
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde ( <i>Lyrall</i> )	5% pet.	
Methyldibromo glutaronitrile	0,5% pet.	
Fragrance mix II	14 % pet.	
Methylisothiazolinone	0,2% aq.	
Textile mix	6,6% pet	

*Kilde: Bruze M, Goossens A, Isaksson M. Contact Dermatitis 2014;71, 35-40; Isaksson M, Ryberg K, Goossens A, Bruze M. Contact Dermatitis. 2015 Jul;73(1):15-20.*

Anvendes **True Test panel 1, 2 og 3** bør testen, som et minimum suppleres med:

Sesquiterpene lactone mix	0,1% pet.
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde ( <i>Lyrall</i> )	5% pet.
Fragrance mix II	14 % pet.
Methyldibromo glutaronitrile	0,5% pet.
Methylisothiazolinone	0,2% aq.
Methylisothiazolinone/methylchlorisothiazolinone	0,02% aq
Textile mix	6,6% pet.
Primin	0,01% pet.
Formaldehyde	2% aq.

I TRUE Testen indgår black rubber mix i stedet for IPPD og caine mix i stedet for benzocaine.

April 2019

## **FORSLAG TIL OPDATERING 2019**

En 2019 opdatering af den europæiske basisserie er publiceret (Wilkinson M et al. Contact Dermatitis. 2019 Jan;80(1):1-4.

Opdateringen omfatter inklusion af:

<b>Allergen</b>	<b>Konc.</b>	<b>Bemærkning</b>
2-hydroxyethyl metacrylate (2-HEMA)	2% i pet	Allergi over for dental og negleakrylater Bør først doseres i kammer, når patienten er der, da der ellers er afdampning.
Propolis	10% i pet	Forekommer i naturprodukter og kosmetik
Cain-mix III Benzocaine 5% Cinchocaine 2.5% Tetracaine 2.5%	10% i pet.	Til erstatning for benzocain, er vist at være mere sensitiv.

Samtidig udgår

<b>Allergen</b>	<b>Konc.</b>	<b>Bemærkning</b>
Benzocain	5% i pet	Erstattes af cain mix III
Primin	0.01% i pet	Udgår pga. sjældent positiv
Clioquinol	5% i pet	Udgår pga. sjældent positiv

## **ANBEFALING FRA DANSK KONTAKTDERMATITIS GRUPPE April 2019**

Gruppen har besluttet ikke umiddelbart at anbefale fuld implementering i Danmark af opdateringerne, men at afvente yderligere data, idet flere af de nye allergener ikke umiddelbart bedømmes relevante for danske forhold. De nye allergener stiller også øgede krav til den tekniske udførsel af testen. Dermatologer kan således indtil videre vælge fortsat at teste med Europæisk basisserie baseret på anbefalingerne fra 2014/15.